



# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,  
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

Від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Керівникам структурних підрозділів  
з питань охорони здоров'я обласних,  
Київської міської, обласних  
державних адміністрацій**

Міністерство охорони здоров'я України у зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 надсилає для використання у роботі інструкцію з екстреної профілактики правця.

Просимо довести зазначену інструкцію до закладів охорони здоров'я та інших заінтересованих організацій й населення на відповідних адміністративних територіях.

Додаток: на 3 арк.

**Перший заступник Міністра**


**Олександр КОМАРІДА**



Ігор Поворозник 096-735-07-28  
Ірина Хальота 097-283-83-24

Міністерство охорони здоров'я України

26-04/5406/2-22 від 27.02.2022



АСУД "ДОК ПРОФ З"  
Міністерство охорони здоров'я України  
№26-04/5406/2-22 від 27.02.2022  
КЕП Комаріда Олександр Олегович  
58E2D9E7F900307B04000006FD82B0024D39500

ДЕПА:ТІА...  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ВІ. 04.03 2022  
1213/03-04-в-с

## Інструкція з екстреної профілактики правця

В період воєнного стану надзвичайно актуальними постають питання збереження здоров'я військовослужбовців як одного із чинників підвищення боєздатності військ та профілактики серед них інфекційних хвороб, у тому числі правця. Водночас існує великий ризик розвитку правця і серед населення.

### Екстрена профілактика правця показана при:

- травмах з порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок;
- опіках та відмороженнях (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступеню;
- проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту;
- пологах поза медичними закладами;
- гангрені або некрозі тканин будь-якого етапу, абсцесах;
- укусах тваринами;
- позагоспітальних абортах.

Важливо своєчасно провести екстрену профілактику правця, яка передбачає:

- первинну хірургічну обробку рани;
- створення імунологічного захисту.

### Рекомендовані препарати, для екстреної імунопрофілактики правця:

**АДП-М** - адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом антигенів.

**ППЛІ** - протиправцевий людський імуноглобулін, який виготовляють з крові імунних людей. Одна профілактична доза ППЛІ вміщує 250 міжнародних одиниць (МО).

### Які терміни введення:

- **АДП-М** - не раніше 3-го та не пізніше 12-го дня після травми до 20 днів з моменту отримання травми.
- **ППЛІ** - імуноглобулін застосовують негайно для профілактики правця у дітей та дорослих замість конячої протиправцевої сироватки.

### Спосіб застосування та дози:

- **АДП-М** - вводити глибоко внутрішньом'язово в ділянку дельтоподібного м'яза в кількості 0,5 мл (разова доза). Перед введенням ампулу ретельно струсити до одержання гомогенної суспензії.
- **ППЛІ** - вводять у дозі 250 МО внутрішньом'язово у верхній зовнішній квадрант сідниці.

**Схема вибору профілактичних засобів при проведенні екстреної профілактики правця  
(Наказ МОЗ України від 05.08.99р. №198)**

Попередні щеплення проти правця		Вікова група	Терміни, що пройшли після останнього щеплення	Застосовані препарати	
Наявність документів про щеплення				АДП-М анатоксин	ШІ
Є документальне підтвердження	Повний курс планових щеплень відповідно до віку	Діти та підлітки	Незалежно від строку	Не вводять	Не вводять
	Курс планових щеплень без останньої вікової ревакцинації	Діти та підлітки	Незалежно від строку	0,5 мл	Не вводять
	Повний курс імунізації <sup>1</sup>	Дорослі	Не більше 5 років	Не вводять	Не вводять
			Більше 5 років	0,5 мл	Не вводять
	Два щеплення <sup>2</sup>	Всі вікові категорії	Не більше 5 років	0,5 мл	Не вводять
			Більше 5 років	1,0 мл	25% МО
	Одне щеплення	Всі вікові категорії	Не більше 2 років	0,5 мл	Не вводять <sup>3</sup>
Більше 2 років			1,0 мл	25% МО	
Не щеплені	Діти віком до 5 міс.	-	-	Не вводять	25% МО
	Інші вікові групи	-	-	1,0 мл	25% МО
Немає документального підтвердження	В анамнезі не було протипоказань до щеплень	Діти віком до 5 міс.	-	Не вводять	25% МО
		Діти віком від 5	-	0,5 мл	Не вводять <sup>3</sup>

		міс. підлітки, військово- службовці			
	Інші контингенти	Всі вікові групи	-	1,0 мл	25 МО

**ПРИМІТКИ.**

1. Повний курс імунізації АДП-М-анатоксином для дорослих складається з трьох щеплень по 0,5 мл кожне з інтервалом 4 тижні між 1 та 2 дозами та 6 місяців між 2 та 3 дозами, ревакцинація через рік, в подальшому кожні 10 років.

2. Два щеплення за звичайною схемою імунізації (для дорослих та дітей) та одне щеплення при скороченій схемі імунізації для дорослих.

3. При ранах, що піддаються зараженню («інфікована рана»), вводять ППЛ.